

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-13-chem | \[Electro-encéphalogramme et psychologie\]](#) ItemTypes d'[onde α] et types psychologiques

Types d'[onde α] et types psychologiques

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0281

SourceBoite_044_A-13-chem | [Electro-encéphalogramme et psychologie]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Walter, Grey](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Types d'x et types y eg.

281

Goffe, Hutton et Waller (1943) ont montré
- des sujets ayant des x persistents (P),
difficile à bloquer par un effort mental, ces
sujets avaient une imagerie + très auditive, mines
théâtrales et hostiles, que visuelle.

- des sujets ayant un "x" "répondant" (R)
étaient capables de former des images visuelles
qu'ils ont vu.

- des sujets ayant un x petit et intermittent,
transformaient chaque geste en image visuelle
visuelle.

Le type P avait une respiration irrégulière
et un mode sub-vocal; le type M avait une respiration
régulière.

Ces types P, M, R n'apparaissent guère
chez l'enfant avant 10 ou 12 a.

BnF
MSS

Creux W (in E.E.C.
1212)

