

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_044\\_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite\\_044\\_A-17-chem | \[sans titre\]](#)[Item\[La perception du temps \(suite\)\]](#)

## [La perception du temps (suite)]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0390

SourceBoite\_044\_A-17-chem | [sans titre]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Woodrow, Herbert](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

|                            |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| 30 cs, erreur systématique | + 6,2 %  | 390 <sup>6</sup> |
| 60                         | + 0,33 % |                  |
| 70                         | - 0,84 % |                  |
| 120                        | - 2,08 % |                  |
| 400                        | - 4,6 %  |                  |

D'où par extrapolation temps d'ind.  $\tau$  (62,5 cs.)

### 3 La sensibilité $\neq$ celle de la sens. temporelle.

a Difficulté de m.e.t. : les excitation se suivent, mais  
pas de réversibilité, et les intervalles entre les excitation  
sont de la même nature que les stimulations.

3 difficultés

1. erreur de période : ordre et lequel se suivent les  
stimulations.

2. intervalle temporel qui s'écoule entre les intervalles  
à comparer. Cet intervalle peut être éliminé grâce  
à la distinction des intervalles utiles.

3. mais dans ce cas, il y a une incubation et rythme  
ou tout au - groupement

La m.e.t. de comparaison n'a pu donner de  
bons résultats.

b Les résultats

D'où un plan de reproduction : fixer la durée d'  
stimulation en la reproduisant. Cette m.e.t. a donné  
les résultats suivants : la variabilité est

BnF  
MSS

minima pour l'intervalle d'intensité.  
 Résultats de Woodrow ( $\sigma$  = mill. de sec).

$\sigma = \text{cm. eblan}$

| <del>200</del> | Variabilité $\left( \frac{\sigma}{M} \times 100 \right)$ |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 20 cs          | 10,3%                                                    |
| 40             | 8,5%                                                     |
| 60             | 1,8%                                                     |
| 80             | 8,2%                                                     |
| 100            | 8,6%                                                     |
| 150            | 8,8%                                                     |
| 200            | 10,1%                                                    |

Ceci a été calculé avec des excitations audiotones.  
 Goodfellow a trouvé 1 seul diff. de 7% par l'audition, de 9% par le tact, 11% pour la vue.

1 autre auteur a montré que si on oreillait les sujets, la vue et le tact s'éduquaient très vite. C'est sans doute la marque d'habitude qui détermine la vue et le tact.

Pas de liaison avec la notion de la simultanéité.

La loi de Weber s'applique-t-elle

1 La loi de Weber s'applique essentiellement à des diff. quantitatives d'intensité:

2 Pour tout le résultats ci-dessus sont satisfaisants  
 qui s'y a (analogie avec la loi de Weber, pour les valeurs en + les moindres: mais les valeurs sont pour valeurs

