

Analyse cas d'hystérie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0458

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Pavlov, Ivan Petrovič](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Obs : 1 malade, au moindre bruit, au moindre mot, se tressaille, se tortille, tourne sur elle-même, admet un trouble du langage. A la suggestion brutale elle réagit par un accès d'hystérie avec évanouissement.

C'est 1 sujet de type faible, avec prédominance du 1^{er} système signalétique.

Ds sa vie antérieure, a souffert de crises nerveuses et s'est tenu en garde avec méthode de défense.

(a) sur 1 fond de faiblesse de l'organisme sensible, ils ont formé 1 foyer d'excitation pathologique, insérée au niveau de l'écorce.

(b) Les motifs en réponse aux excitations faibles sont la crainte de la généralisation de l'excitation ; ce qui au foyer latent préexistait s'ajoute 1^{re} excitation.

(c) L'apparition des crises hystériques est typique parce que l'excitation forte, venant s'ajouter aux foyers d'excitation latents, induit l'inhibition.

BnF
MSS

⑤ La localisation corticale d'un foyer d'excitation patho.^u incertaine est confirmée par le palguisme hypnotique léger, avec inhibition de l'analyseur moteur (stade de l'hypotaxie) amène le mot.

d'après des observations de Pavlov.
Birman : Travaux de Pavlov en clinique
neurolog. . 1951. (trad. Roussot)