

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage](#) [Item](#)[Importance thérapeutique de l'inhibition induite](#)

Importance thérapeutique de l'inhibition induite

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0463

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Importance thérapeutique de l'inhibition motrice

463

Ex : 1 chien très excitable : on lui fait
prier / courir et la pte ; au bout de qqes
essais, la seule vue de la balle provoque des
actes de défense très disproportionnés, que n'explique
ni l'action du broue

or l'audition d'une corne très forte calme
cette agitation motrice g^{de} : l'excitation
d'orientation provoquée par cet excitant provoque
1 inhibition.

- On injecte à des chiens de la morphine
⇒ reac. conditionnées et inconditionnelles à
cette morphine - mais si on introduit des
excitants étrangers, les reac. cond. et int.
disparaissent.

- L'action d'une figure de Eulhocrinine
sur 1 singe excitable s'est trouvée être
nulle, à cause de l'excitation provoquée
par les représentants de la figure

- chez le chien on provoque 1 état
fêlé avec du dinitrophenol, chez d'autres

1 est catéptique avec de la pulbo-
caphrine. Puis on charge : au 1^{er} on injecte
de la pulbocaphrine, au 2^d du diméthylphénol

Au pulbocaphrine provoque chez le 1^{er} 1
température oscillante ; chez le 2^d le dimétho-
phénol provoque 1 est catéptique avec
flexibilité accrue.

De ce dernier cas "l'absence de réceptivité
vis à vis de l'agent neu" est déterminée par
l'accord neuro-dynamique initial, par
les relations réciproques du processus d'excit-
ation et d'inhibition organisés d'une manière
définie

est "concurrence de stéréotypes"

Dolint de 2 borovs maïa

(Ravon, n° 5)