

[Paranoïa et névrose obsessionnelle (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0467

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Janet, Pierre](#)
- [Pavlov, Ivan Petrovič](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Parlov cite Janet : "Le délire de persécution est très proche des états obsessionnels."

Pourtant il y a des différences entre névrose obsessionnelle et paranoïa.

Différences entre névroses obs. et paranoïa

1^{re} diff^{er} : La paranoïa est chronique et incurable. - des causes pathogéniques en effet peuvent concurrencer l'impact patho

- des neurones récepteurs du ~~1^{er}~~ système de signalisation (sensibilité extéro et intéro-ceptive) : hallp → paranoïa

- des neurones du système verbal

De +, ils peuvent être + moins forts : → soit au niveau des repr. réelles, soit au niveau des sens & hms (hallucinations)

cette diff^{er} est due égale^{ment} au cerveau : si le sujet est faible, le processus d'exécution stéréotypiques vont être peu^{ement} élargis par l'inhibition → neur. obs.

si le sujet est fort, ~~l'inhibition~~ l'inhibition disparaît totale^{ment} → paranoïa.

2 La 2^{de} diff^{er} : Le paranoïaque perd la
benévolence de critique

En effet, chez les sujets de type fort, l'incerti-
p^{tho}. de l'excitation est si accentuée qu'elle est
indépendante aux influences des régions saines de
l'écorce.

De +, 1/ la loi d'induction négative
+ ~~induction~~ une inhibition ~~très~~ forte et très
étendue, est provoquée par 1 forte excitation

Cette inhibition forte est 1 inhibition, non
active, mais externe et passive.

"Les cliniciens, psychiatres et neurologues
auront désormais à compter avec ces 3
~~phases~~ ^{phases} ~~variantes~~ physio p^{tho} bien établies :

- la benévolence de l'écorce et l'écorce de point
p^{tho} nettement établie
- incertitude p^{tho} du processus d'excitation
- phase ultra paradoxale "

Encephale. Juin 1935
(Essai d'interpr. physio de la paranoïa
et de la neurasthénie).

Brochure. 1933. Leningrad)