

La maladie selon les successeurs de Pavlov

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_A_f0483**

Source**Boite_044_A-22-chem | L'apprentissage**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Pavlov, Ivan Petrovič](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La maladie s/ le succⁿ de Pavlov

"A présent on prend de + en + esc. que l'origine d'une maladie est 1 phéno non moins complexe que l'organisme au sein duquel se nit la mal, que nos attitudes simplifient le processus complexe qui conduit à la maladie, que des actions émotionnelles sont souvent susceptibles d'exercer 1 influence bnf + puissante qu'1 facteur physique & que qu'1 prole peut produire des modifications profondes d'1 organisme H entier."

(Bykov)

Commentaire de la ffitte

"Ce qui caractérise et domine le processus pathologique, ce n'est pas tout & le permet la médecine classique, l'attaque microbienne ou virale, l'intoxication, l'traumatisme, ou encore 1 trouble du métabolisme, ou de la régulation hormonale."

Bnf
MSS

Ce qui permet de saisir l'ensemble du processus morbide et de le caractériser, c'est 1 trouble de l'activité nerveuse sup^{re}, trouble de l'équilibre métabolique, assuré par la

88
corticale entre le veto et l'interception

le trouble de l'activité nerveuse sup-
répond à la fois sur

- le comport^{mt} social de l'individu
- et par l'intermédiaire du système cortico-
viscéral, sur les fonctions organiques

Les modifications entraînées peuvent être
au début uniquement de type fonctionnel
psychique réversible, pour aboutir, en 2^e
étape au type lésionnel.

La Raison n° 3