

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage ItemLa cure de sommeil : historique et technique](#)

La cure de sommeil : historique et technique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0485

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Pavlov, Ivan Petrovič](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La cure de sommeil : historique et technique

Historique

485

1/ Période historique : pr 1 sommeil profond de durée limitée, on cherche à lutter c^{te} l'agitation des gas ma^{tes}. Wolff utilise, pr des manigè^{res} et des Diemen h^{mic}res, les sulfones (en particulier le Trional) ; Trene^l emploie le chloral.

2/ Découverte des barbituriques : K^lausi à Berno fait des cures de sommeil au Luminol : il cherche à provoquer 1 anesthésie des centres nerveux sup^{rs}, pr "rompre le cercle vicieux" de l'excitation affective et de l'agitation somnolente. Max Muller en 1925 utilise le Dial.

~~En~~ Enche (1928) le tribromoethanol. En 1930 Cloetta (Zurich) réalise 1 mélange au somnifère les barbituriques qu'il a 1 g^o succès. E^y et Mignault chez Claude utilisent en 1931 le somnifère.



3/ En 1925 P^{ro}co le parloisienne étudie le sommeil animal; en 1935 on l'applique à l'h., avec le mélange de cloetta, l'amylal sodique, le chloral ou le bromure de sodium. On utilise égal^{mt} le conditonal.

Techniques

1/ L'hibernation vraie (technique de Labonté) :
qui a son origine est les travaux de Seelye et
de Reilly. Il s'agit de déconnecter le système
neurovégétatif par les neuroptéigiques ; on obtient
un ralentissement métabolique par abaissement de la
température centrale.

2/ La cure neuroptéigique simple : utilisation
exclusive du Largactil, en cure prolongée et
continue : "phobonomie pharmacologique" (Labonté).

3/ La cure de sommeil provoquée par les neuro-
ptéigiques associés aux barbituriques.

Pas de repos si standard préliminaire 15 à 20 h.
de sommeil par jour (il peut en avoir 48 h).

On peut utiliser un mélange de :

100 à 150 mgr de Largactil (inj. intramusculaire.)

0,30 à 1 gr d'Eunorkal per os.

au besoin 1 ou 2 injections de sédatif.

20 h. de sommeil ^{par} ~~représentant~~ ^{représentant} 1 maximum.

V. Cartier Gaultier.

La cure de sommeil. La Revue
de psychiatrie. T. IV. n° 17. 11 juin 54.
p. 1583.