

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité.](#) [\[B\]CollectionBoite_042_B-4-chem | Cybernétique](#) [ItemGestalt et universaux](#)

Gestalt et universaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0391

SourceBoite_042_B-4-chem | Cybernétique

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Ces test et universaux

1 "No tendons à amener l'objet que
attire notre attention à $\pm$ position standard
et à $\pm$ orientation standard de telle manière
que l'image ~~form~~ visuelle que nous formons
soit le moins possible." c'est ce qui régit
- le processus qui permettent la projec-
tion sur la fovea
- la convergence des 2 yeux

2 Nous sommes capables de reconnaître les
lignes et le dessin (outline drawing):
par ex le dessin d'un profil, on le reconnaît sans
cf l'être humain

Ceci s'explique parce que la rétine est soumise
à l'accommodation: qd $\pm$ stimulus se maintient,
la rétine devient de - en - capable de recevoir
et de transmettre ce stimulus. C'est pourquoi la
stimulation de 2 régions contiguës les fluctuations
(variables) de x de fixation provoque l'alter-
nance entre les 2 stimuli: alternance qui se
diminue p, mais au contraire augmente la
sensibilité: $3/4$ des fibres du nerf optique
répondent au flash "on" de l'illu-

mination. Or, en elle-même chaque image visuelle a déjà quelque chose de la nature d'un "line drawing".

Cette diagrammatization se poursuit au niveau du nerf optique : le niveau des fibres de transmission diminue ; l'impression qui n'a pu être brouillée au delà du cerbère limite "biggers" et n'est impression d'acuité brouillée

— maintenant c'est le pic la comparaison avec les images antérieures

① La forme d'objet peut être transformée par des opérations que l'on appelle "groupes de transformation" (translation, rotation, groupe α/π , dilatation homogène, k groupes continus, i.e. opérations ~~opérations~~ de l'ensemble des paramètres variables de manière continue.

② Il y a 1 région d'un plan à 2 dimensions est couverte par le procédé de scanning (par lequel l'ensemble distribué uniformément de positions échantillonnées d'une région, est pris et représenté le tout), de sorte que chaque région est 1 groupe spatial i.e. représenté par 1 processus de group-scanning. Or 1 procédé de ce genre, 1 réseau de positions d'épave