

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)
[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0113

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

33 %	des animaux : d'après le 1 ^{er} mois	7
45 %	_____	2 mois 1 1 2
57 %	_____	3 mois
74 %	_____	4 mois
79 %	_____	5 mois
91 %	_____	6 mois.

Il est évident que les schémas ne di... en...
 nous l'ont : d'abord le schéma espace-temps, puis le schéma
 copulatoire. Beach a établi la proportion différentielle
 des diff. schémas. On a tenté, par la grille électrique,
 le desir du mâle castré de répondre la femelle en retour.

2. Réaction de l'hypophyse antérieure castrée / régénération
 des glandes endocrines et variant des gonades. L'animal
 hypophysectomisé n'a plus de P.S.

3. Séries d'expériences

① rat	hypophysectomisé	= 0 (nul)
② rat	_____ + androgène	= + (normal)
③ rat	_____ + hypophyse	= + (normal)

BnF
MSS

3. Il y a des facteurs hormonaux qui influent sur
 le P.S. Il y a diminution de l'intérêt pour la femelle, qd
 le mâle a copulé avec / ou. Il semble donc que les
 mécanismes ultérieurs sont soumis à la régulation endocrinienne
 par les hormones sexuelles, alors que le comportement androgène
 est l'organisme lui-même.

chez le lapin mâle, m de fert. brutale du C.S.; dissociation
hus os la fert. des /ouches (copulations - copulations)

chez les primates, il y a de nombreux facteurs qui interagissent
l'induction hormonale pure. chez l'h., le C.S. est issu d'un
des diff. individus Moore cite en 1942, que si ces
en vertébrés supérieurs le C.S. dépend des hormones, chez
l'h., c'est l'h., la ψ , l'initiation jouant un rôle important.
chez l'h. le seul rôle indispensable des testicules est la
procréation. Il en est de même du ψ mâle et r.é. du
l'hypothalamus. S hier découvre 4 sources

- 1 le testicule
- 2 les hormones
- 3 le sy. nerveux végétatif
- 4 les stimuli ψ sexuels (^{hémisphères} _{cérébraux})

ce sont surtout les derniers qui prédominent.

c'est le r de vue évolutif qui est le + éclairant
pour la compréhension de ces faits. si on ne peut pas ne pas
tenir ^{compte} des /ouches ψ chez l'h., ceux-ci ne sont pas négligés
à l'h. chez de nombreux vertébrés on trouve des h.:

- 1 stimulation du r.é. castri par l'ovule + ch.é
- 2 indépendance de la libido et de la puissance.
- 3 comportement mâle de la femelle devant (mâle) premier

si chez les vertébrés, on considère l'échelle qu'on du vert.
jusqu'à l'h., l'induction hormonale devient
moins claire, mais que prédominent les influences
endocriniennes (influences sur le cerveau).