

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce. Item](#)[\[La connaissance de l'espèce. suite\]](#)

[La connaissance de l'espèce. suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0134

SourceBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Plus les récepteurs sont nombreux, + les différences locales
sont faibles ($\frac{1}{2}$ millimètre de la pointe de la langue; $1 \frac{1}{2}$ mm
à la pulpe du doigt; 4 mm au poignet; 15 cm os fém.)
Par le haut de la main la localisation est m / jour (6 mm
pr le haut au poignet; 8 mm pr le poignet au coude) Ponzio
elle est + jour pr le poignet: 3 mm pr le haut

Pr l'acuité (distinction de 2 points), compte de
Weber: qd 2 points on peut m distinguer, ils tombent
dans un seul des cercles Weber. Mais qd la distinction n'est pas
+ c'est que les depressions du tegument se rejoignent
et n'en font qu'un. Pr entre cela, on fait 2 recs
successives: la distinction se fait bien mieux, de recourir
au schéma la distinction des récepteurs. L'acuité diminue
s'ajoute un m / jour

Le nombre des neurones ne croît pas aussi vite que la
surface du corps - on a calculé (Dapirque)
Ainsi 1 h. de - que la surface croît d'un du poids à la puissance 0,66
1 m, 88, p / jour
2 / jour + qu'il h.
de 1 m 50, chaque
de la surface du
champ spatial
accroît de 30%
 $S = P^{0,66}$
que la taille croît de la prop $T = P^{0,33}$
la sensibilité de la proportion de sens $\propto P^{0,2}$
5' de m / jour

La sensibilité est beaucoup plus qd il s'agit d'excitations
simultanées, et beaucoup plus pr les excitations successives.

Il existe des limites apparentes de sensibilité les limites (optimum)
2 points écartés de 25 mm, par 2 recs de 1/10 de sec se succédant à 1/10
de sec

La sensibilité tactile varie suivant la région du
corps: on applique 1 à 4 à la peau du sujet, et on demande
au sujet c / m. de l'orienter: le sujet se repose convenablement
(on lui donne un dessin)