

Mécanisme de la fécondation. Radlkofer.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0175

SourceBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Radlkofer, Ludwig](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Rasplkov

"La naissance de l'embryon de la
Phanérogame, est le résultat de modifica-
tions imprimées à une cellule formée
à l'état embryonnaire - la ves. embryon-
naire - par un lutre pollinique descendant
de son voisinage et de la cellule con-
tenu de l'un des ~~de~~ cette cellule."

Le pollen ne se peut pas se développer
sans lutre

"Le lutre pollinique est le résultat de
l'union de la matrice pollen et de la
cellule matrice est analogue à celle qui
remplit le sac stérile du Fœtidé,
aux spermatozoïdes de certains crypto-
games et aux zoospermes des animaux."



Rasplkov. D^{re} de l'embryon
de la phanérogame.

(Ann. de sc. nat. 4^e série. V.
1896. n° 247. 248).

