

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-9-chem | Variations ItemLes différents types de variations. Y. Delage.](#)

Les différents types de variations. Y. Delage.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0233

SourceBoite_039-9-chem | Variations

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Delage, Yves](#)

Références bibliographiques[Delage, L'Hérédité et les grands problèmes de la biologie générale](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30312713v>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Delage, Yves (1854-05-13 -- 1854-05-13)

TITRE

L'Hérédité et les grands problèmes de la biologie générale, par Yves Delage,... 2e édition, revue...

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE

1903

EDITEUR

Paris : Schleicher frères , 1903

Les différents types de variations 231

Y. De Pese.

1. Les variations indépendantes.

Spencer pense qu'il n'y a que des variations indépendantes. Ce n'est ni vrai, mais c'est un fréquent.

Il suffit que 1 moitié du corps puisse varier sans l'autre (variations unilatérales qu'on trouve chez le poisson, plat)

2. Les variations corrélées.

Il y a une ou un groupe d'attributs corrélés :

2 variations multiples d'organe qui ont une origine embryologique. (ex : la corne chez le mouton ; dent et cheville chez l'h.).

3 variations de 2 parties d'organes distinctes.

Ex : le cycle de vie de la larve de la drosophile.

Il y a variations de la vésicule sécrétrice,

des poils et des os (corne ostéogène)

cf. aussi le exemple de Baboon. aussi :

185
en position, plat, et la queue est
"deplacée"; mais la nageoire
dorsale qui est à l'arrière de la
queue, mais elle attend de se
développer un peu plus et finira
deplacée, sans que elle ne se
détache de son emplacement initial.

3. Variations morphologiques.

- Il arrive que dans le cas d'hybridation,
il y ait des variations anisotropes (par
exemple chez le melon, et chez d'autres cucur-
bitacées) de sorte qu'il y a un mélange de
gènes de l'individu de référence.
- Dans le cas d'hybridation, il y a une modification
très nette de la morphologie de la
variante (le blanc est très différent
de l'autre).

La variation morphologique "morphologie"
est due à la présence d'un gène