

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-18-chem | Alexander Item](#)[Les exp\[ériences\] extrathérapeutiques](#)

Les exp[ériences] extrathérapeutiques

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0448

SourceBoite_038-18-chem | Alexander

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Freud, Sigmund](#)

Références bibliographiques[Alexander, Psychoanalytic Therapy. Principles and Application, New York, The Ronald Press Company, 1946](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La réaction neurotique aux expériences traumatiques peut avoir trois degrés d'intensité:

- parfois l'ego a simplement besoin d'aide pour faire de nouvelles tentatives afin de trouver des satisfactions à ses besoins
- parfois ils réagissent au moindre changement de leur situation en fuyant et le fantasme de la régression.

Il y a deux interventions. - D'1er car, le + grand profit de la thérapie a lieu en dehors des séances; et le 2^e, il peut parfois intervenir le malade.

2/ On a l'habitude de penser que le moment d'intervention possible est la régression.

En fait Freud lui-même, a proposé des hypothèses monothétiques l'analyste doit encourager le malade à entreprendre des activités qui l'enrichissent (le m. qui reprend le contact humain, doit à 1 moment donné le rechercher)



3/ Autre point très répandu: "aucun changement important est la régression la cause." Prévenir l'acting out de pulsions libérées (par

puéril (souvent) en des moments de
reue. (du type : actes d'indépendance en reue, dit
le mot du cas. des besoins de répit)

En psychosomatisme, l'évidence du changement
peut retarder la guérison. Des verbes en,
le malade doit se marier etc...

De "m de change" n'importe pas si l'on ne voit
la cure, sauf si le malade est analysé
avec accord."

Joan. Therapy. (pp 39
40)