

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-23-chem | L'EEG \[Électro-encéphalogramme ?\] et la pathologie. Item\[La schizophrénie et l'Electroencéphalographie - suite\]](#)

[La schizophrénie et l'Electroencéphalographie - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0508

SourceBoite_038-23-chem | L'EEG [Électro-encéphalogramme ?] et la pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Davis, Hallowell](#)
- [Hill, Denis](#)
- [Lemere,](#)
- [Lennox, William](#)
- [Walter, Grey](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

cortex. Il peut être différent de l'activité, continue
ou intermittente. Il tend d'ailleurs à l'inhibition du
dorsal due à l'activité non synchronisée de
système n. central

508

G. Walter observe que les amplitudes de
Davis sont à l'abaissement de temps lat + brief que
les autres.

Hill trouve 3 rythmes choppy sur 24 cas
de schizophrénie déprimée ; et 3 sur 9 cas
de schizo mania.

Rubin (1942) Ellis et Lennor (1944) ont
observé que très peu de schizo présentent du rythme
lent et hyperthymal (3% de schizo contre 55%
du groupe contrôle après Rubin)

Levine (1936) trouve à l'indice 2 bas
chez les schizo ; Walter trouve que P 2
succède ~~plus~~ mieux aux autres.

Liberson (1945) trouve 21% de schizo avec
le passage prédominant de P 2 sur l'hémisphère
gauche.



Hill. EEO
(351.356)

