

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-23-chem | L'EEG \[Électro-encéphalogramme ?\] et la pathologie. ItemLa personnalité psychopathique et l'EEG \[Electroencéphalographie\]](#)

La personnalité psychopathique et l'EEG [Electroencéphalographie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0510

SourceBoite_038-23-chem | L'EEG [Électro-encéphalogramme ?] et la pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Hill, Denis](#)
- [Watterson, D.J.](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La personnalité psycho pathique et l'EEG.

1/ Sur les anomalies, le % de d'anormalité chez les psychopathes varie de 48% à 75%.

L'anomalie la + fréquente, c'est le θ , en 510 μ s bilatéral et synchron, avec $\pm$ amplitude qui dépasse rarement l' α .

2/ Il est connu que le rythme θ est surtout présent, bilatéral et synchron, chez les enfants, ce qui a conduit à la structure médiante, par ailleurs, il a montré que $\pm$ genre de psychopathes, avec ces aggrégats et attaques d'activité anormale des foyers unilatéraux de 3-5 c/s, d'amplitude modérée, et à une lenteur.

3/ Il est difficile de distinguer ces phénomènes de ceux de l'épilepsie. on admet en général que

- les "paroxysmes d'outbursts" ne sont pas fréquents chez les psychopathes (2-3%), mais chez les épileptiques (25%).

- chez les psychopathes la fréquence est relativement stable, avec $\pm$ distribution normale dans le groupe; chez les épileptiques il y a une augmentation et il y a 2 maximums dans l'étude.

Un psychopathe qui montre des paroxysmes d'outbursts est un EEG dont on a vu l'existence.

BnF
MSS


± épileptique latent.

4/ Knott et Gottlieb : qd chez ± individu coincident ± "histoire positive" et ± traumatisme ou ± maladie, les chances de dysrythmie sont accentuées.

5/ Il semble que la dysrythmie ne soit pas due exclusivement à des peurs innées ou à des peurs acquises. Mais ils rappellent à ± trouble et le processus de maturation qui dépendent eux-mêmes de peurs innées et acquises.

Hill et Watterson ont montré que des résultats obtenus sur des jeunes xophtes venant normaux chez des enfants. que des rythmes caractéristiques de xophtes adultes, se trouvent chez des enfants qui ne deviennent pas xophtes. Le θ diminue avec l'âge

—•— 180 Psycho
phts
..... 257 normaux



Hill (in EEO
pp 346-348)