

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036](#) | [Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-18-chem](#) | [Médecine classificatrice. ItemObs\[ervation\] de paralysie \(Morgagni\)](#)

Obs[ervation] de paralysie (Morgagni)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0310

SourceBoite_036-18-chem | Médecine classificatrice.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Morgagni, Giovanni Battista](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Ob. de paralytie (Morgagni)

310

70 ans; apoplexie très ancienne; hémiplegie;
mouvements du côté droit;
intels.

"Pdt qui on enleva le cerveau de l'inté-
ressé/de crâne, il s'écoula de la substance qui
à l'ouverture de la dure mère était très-moelleuse. Le
cerveau charnière de la base gauche présentait
à l'apex du lobe inférieur et près de l'apex
composé de substance hyaline et de substance
ou un ventricule était isolé et les parois
étaient formées par substance grise et molle
qui présentait l'aspect."

Morgagni (Méd. Pratique)
Recherches anatomiques 1821. II. 109-110



À l'autre extrémité de la dure, hémiplegie
avec convulsions: on trouve entre les membranes
à l'extrémité inférieure qui irradie avec
une ou deux convulsions sur
côté, si à moitié n'est déjà été analysé.
La moelle est très-à l'extrémité

~~plâtre~~ de ~~ce~~ sur le mur à l'ouest
du mur, en son corps simple -

Th. J. p 110 -