

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_036 | Naissance de la clinique.CollectionBoite_036-28-chem | Hybridation. Item](#)[Les produits des croisements : métis et hybrides](#)

Les produits des croisements : métis et hybrides

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0505

SourceBoite_036-28-chem | Hybridation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les modèles de croisement: ^{Wetzel} Hybrids
(Y De Coze) 05

1. A la 1^{re} génération, le modèle de croisement est toujours un être vivant unique, et intermédiaire entre les deux parents.

- Gacriker a prouvé que
a les hybrides (de 2 espèces différentes) sont
très homogènes - la 1^{re} génération
b les méti (deux unités) sont immu-
ables et polymorphes.

- Macleli prouva que + les parents sont différents
+ le modèle est uniforme et intermédiaire
entre les 2 parents.

- Focke conclut

2. G. S. Hitzig a établi que par le
animisme, les caractères des deux parents
animal tendent à se mélanger chez les
méti

à se fusionner chez les hybrides

- Focke admet cette règle par le plante

- à l'analyse d'un individu, le croisement

de couleur brun ou noir
- en la 2^e étape, une couleur
uniforme intermédiaire.

3. Après 1^{re} génération, il y a
une certaine uniformité, il y a
un polymorphisme considérable. Les
produits peuvent se trouver en formes
mises.

Après au bout de 3 ou 4 générations, il peut
arriver qu'apparaissent des formes dominantes
qui, si on les cultive, deviennent
dominantes.

Le 1^{er} est obtenu avec les mirzili;
Gordon avec le Linaria et le Datura.

γ - idole. de l'hermine
n° 275-277.