

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_B | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[B\]CollectionBoite_044_B-2-chem | Rorschach. \[D. Defert?\]](#)[ItemDurand de Bousingen, Les réponses Rochers dans le test de Roschach chez l'adulte névrotique et psychotique, Cahiers de psychiatrie, 1952, 2](#)

Durand de Bousingen, Les réponses Rochers dans le test de Roschach chez l'adulte névrotique et psychotique, Cahiers de psychiatrie, 1952, 2

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_B_f0046

SourceBoite_044_B-2-chem | Rorschach. [D. Defert?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Durand de Bousingen.

Les réponses Roches de test de
Rorsch. chez l'adulte neurotique et pol.

cahier de Frührie
1952.2.

Sur un ensemble de malades de épilepsie
psychique, on trouve des resp. Rochers
à 12% des protocoles. (sur 11 p. I, II, VI,
VII, X)

- il se présente surtout chez les sujets jeunes
- la schizo est le syndrome le +
fréq^{nt} rencontré (37%); 40% des
causationnels (31%); 26% sont des
schizoïdes caractérisés.

- si on fait l'analyse de Pangloss/
la méth. Minnows ma, on trouve une assez
forte corrélation avec les facteurs de schizoïdi

- les protocoles sont légèr^{nt} élevés -
hauts, β , avec choc couleur, e pair-obscur,
renven^{nt} fréquents des planches

- en réponse Rochers sont souvent

compléter avec des réponses anatomiques
paysage, sang, eau, squelette.