

Boite_038-41-chem | Maladies. Psychoses et névroses.

Auteurs : Foucault, Michel

Présentation


LangueFrançais

Les notices de la collection

28 notices dans cette collection

En passant la souris sur une vignette, le titre de la notice apparaît.

Les 10 premiers documents de la collection :



[Homosexualité et névrose](#)

Foucault, Michel

1911 (in Selected Papers, 1920)

- A. admet, s/la notion de mélancolie, le caractère rigoureux et typique de son caractère maniaque-dépressif.
- il oppose la oscillation entre de l'ambivalence obsessionnelle, et le rythme + l'ambivalence maniaque-dépressif.
- le malade maniaque-dépressif est c/2 phases de 5 ans, regardé par l'analyste comme un "incorporatif".

af de l'ambivalence se voit être univocal. C'est lui qui est le seul qui est incorporatif d'instincts qui se voient. Il oppose à cela non seulement "qualification anormale", mais aussi d'ambivalence, et ce qui est le seul qui s'oppose à lui.

[Interpr. psychanal. de la manie et de la mélancolie](#)

Foucault, Michel

3/ Abraham: Melancholia and the Development of the Libido (1924) in Selected Papers.

2/ mélancolie et manie obsessionnelle

- se reconnaît par la phase qu'elle précède, par l'ambivalence, et par leur origine c/2 au même stade.
- se distingue en ceci que
- l'état mélancolique rompt la relation objectale précédente, et regagne la phase repulsive de l'ambivalence.
- l'état obs. maintient la rapport à l'objet aimé, et ne rompt pas la phase "répulsive" de l'ambivalence.

[\[Interpr. psychanal. de la manie et de la mélancolie - suite\]](#)

Foucault, Michel

- c/2 figure possible qui ne force de super-ego de l'objet qui peut être lui.
- c/2 objet incorporé + c/2 objet de l'ego et qui est à la fois aimé et attaqué par le super-ego de l'ego.

2/ Abraham explique que c/2 la manie, la phase de mélancolie est la phase "répulsive" de l'objet aimé qui est la phase de l'objet H, mais le repousse à l'extérieur.

En résumé, elle est maniaque-dépressive, et c/2 incorporation et c/2 repulsion repulsive de l'objet aimé (c/2 la mère).

à ce que c/2 la manie obsessionnelle, il y a un fait principal le meurtre du père et l'absence de l'objet aimé.

[\[Interpr. psychanal. de la manie et de la mélancolie - suite\]](#)

Foucault, Michel


pour être la mère : "Je ne réussis à définir p/2 le rôle de la mère - imaginée, et c'est pourquoi le succès thérapeutique n'est y opposé. La phase est réelle, et il faut qu'il y ait quelque chose de réel qui lui soit la mère..."

L'investigation scientifique que porte par un tel sujet est une question qui n'est pas un objet de l'effort thérapeutique : c'est pourquoi l'analyse scientifique est plus que la phase de la mère.

L'h. mère est. p. 269

[Investigation théorique et guérison](#)

Foucault, Michel



[La névrose mélancolique](#)

Foucault, Michel

Tous les documents : [Consulter](#)

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Collection créée par [équipe FFL](#) Collection créée le 28/01/2020 Dernière modification le 23/04/2021