

# **essai sur les phénomènes de la végétation (par Féburier)**

**Auteur(s) : Chastenay, Victorine de**

## **Les folios**

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

3 Fichier(s)

## **Les mots clés**

[Botanique](#) , [Histoire naturelle](#)

## **Citer cette page**

Chastenay, Victorine de, essai sur les phénomènes de la végétation (par Féburier), 1813-04-12

Consulté le 14/01/2026 sur la plate-forme EMAN :  
<https://eman-archives.org/Chastenay/items/show/8783>

Copier

## **Présentation**

Date1813-04-12

## **Information générales**

Languefr  
SourceFRADCO\_ESUP378\_6\_186  
Nature du documentmanuscrit autographe  
Collation3 p.

## **Informations éditoriales**

PublicationInédit

## **Description & Analyse**

Contributeur(s)Le Lay, Colette

Notice créée par [Richard Walter](#) Notice créée le 17/12/2025 Dernière modification le 17/12/2025

---



son expérience bien démontre, que les plantes à fleurs doubles, et même trop  
plus faibles, et plus petites que celles à fleurs simples, et qu'elles se développent  
plus lentement. — Le poids de la fleur double d'œuche, ne peut se comparer  
à celui des parties solides de la fleur simple, compte la longueur, et les  
graines. — Les fleurs doubles arrivent moins de terre. — Les griffes de  
renoncules, les gâtes d'anémone, quand on les replante sans interruption  
restent, on ne les remplace que par une seule. Celles qu'on laisse repousser  
par un long d'œuche. Parviennent plus doubles que les autres, mais  
ne fleurissent ni la première, ni même la seconde année qu'on les  
replante. — L'intensité en regard de la couleur des tablettes. — Les fleurs  
d'anémone comme de doubles dans les terrains froids, et humides. —

Les anciennes graines des fleurs d'anémone, d'œuche plus de fleurs doubles,  
et semi-doubles, que les nouvelles. — Des graines entières long temps, sans  
l'ancien d'œuche, ont quelquefois donné spontanément des fleurs doubles.  
L'intensité en vie linéaire près d'œuche, dans une graine d'œuche plus beau  
jeune. — Les graines de girofles long temps gardés, nous donnent des  
fleurs doubles. — Des graines de choux, et de laitues long temps gardés, ont  
pu produire des graines. — on ne doit donc pas les fleurs doubles, qui se diffèrent  
de la force vitale dans le germe. — Les affaiblissements remarqués par une  
végétation plus lente, des feuilles plus larges. —

Le même auteur a donné en 1803. Des observations sur la végétation  
de la tulipe. —

L'œignon ou bulbe de la tulipe, est composé de 2. ou 4. tuniques, dont  
les uns dans les autres, se recouvrent d'une pellicule de couleur marron,  
plus ou moins épaisse. — Ces tuniques sont de substance résineuse, et  
qui de tissu cellulaire, que l'on peut comparer à l'albumen des cotylédons,  
non de communication entre elles, que par la base de l'œignon, laquelle  
elles adhèrent, donc elles sont le prolongement de la base de la même tige.

en l'entre on distingue un germe un peu gros, qui doit former la tige,  
à côté de la germe, on en voit un ou deux autres, d'œuche, qui doivent former les œignons  
futurs. Dans les œignons qui ont acquis toutes leurs dimensions, on trouve  
les germes, entre la 2. et la 4. même entre la 3. et la 4. tuniques. —  
Les racines sont indiquées par de petites elevations qui entourent la base  
de l'œignon, et attendent l'instant de percer. — Dans un terrain très riche,

Il arrive quelquefois qu'un oignon développe deux germes, dont l'un  
perce la tête de l'oignon, et l'autre se développe, se forme et se nourrit  
un oignon partiel. - il se forme quelquefois un troisième, et le même  
chêne arrive quelquefois aux tubercules, et se transforme par exemple  
l'oignon de d. aut, en l'oignon renouvelé trois fois, et en germe d'oignon  
la plus belle fleur. - la maturité des grains, ou plutôt leur maturation,  
après l'oignon. il ne se renouvelle presque pas. -

un oignon en plein air, commence au printemps à traverser la terre  
l'oignon enveloppé de papier forme un cône. et se nourrit  
concentré. -

Il y a plusieurs années de la floraison de la tulipe, pour que la  
végétation de ses couleurs, donne la brillante fleur, après des lois nouvelles  
plus. - quelle opération chimique? - la tulipe pousse pour entrer en  
contour, elle a une grande tige, quand, elle recouvre une culture,  
qui lui sera peu favorable. - trop d'engrais, trop de froid, trop de chaleur,  
quelquefois une feuille adhère au perianthe de la tulipe, et la tige  
de cette feuille se colore comme la fleur. -

Je n'ai jamais remarqué que quelquefois la couleur d'une tulipe,  
elle ne tache jamais le papier blanc quand on l'écrit, que d'une teinte  
blanc plus ou moins foncé, qui se rapporte au violet noirâtre du pollen,  
dont les anthères sont remplies. -

tantôt on croit que la gousse soit une maladie. - il  
arrive que rarement les grains des fleurs d'orange, dont on avait enlevé  
les pétales, venant à fructifier. -