

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_034_A | Histoire de la folie, préparatifs \[A\]CollectionBoite_034_A-3-chem | Hôpitaux en Angleterre Item\[Bethlem \(Tenon\) - suite\]](#)

[Bethlem (Tenon) - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_A_f0082

SourceBoite_034_A-3-chem | Hôpitaux en Angleterre

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Tenon, Journal d'observations sur les principaux hôpitaux et sur quelques prisons d'Angleterre, 1787](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

" Il est possible que dans ce manuscrit
 de dissiper le boue, de la laisser aller
 et venir. On en trouve dans les corridors
 et dans les passages qui sont restés
 dans les trous sont attachés avec leur
 canards. D'autres sont dans le
 corps par la chaux/bois; un petit nombre
 en chaux par 1 boue et par 2 jours
 un autre est: (31)

Tenon. Journal 5 observations
 sur la pp & hop. et 9999
 min d'Argl. (BnF MSS)
 fol. 29-31

It is not possible to determine the exact date of the discovery of the first case of the disease. The first case was reported in 1817 in the city of Madras, India. The disease was then spread to other parts of the world, including Europe, where it was first reported in 1817 in the city of Messina, Sicily. The disease was then spread to other parts of Europe, including France, where it was first reported in 1817 in the city of Lyons. The disease was then spread to other parts of France, including Paris, where it was first reported in 1817 in the city of Paris.

The disease was then spread to other parts of the world, including North America, where it was first reported in 1817 in the city of New York. The disease was then spread to other parts of North America, including Philadelphia, where it was first reported in 1817 in the city of Philadelphia. The disease was then spread to other parts of North America, including Boston, where it was first reported in 1817 in the city of Boston.

The disease was then spread to other parts of the world, including South America, where it was first reported in 1817 in the city of Rio de Janeiro. The disease was then spread to other parts of South America, including Lima, where it was first reported in 1817 in the city of Lima. The disease was then spread to other parts of South America, including Buenos Aires, where it was first reported in 1817 in the city of Buenos Aires.