

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique. Item](#)[\[Caractères de la phthisie pulmonaire - suite\]](#)

[Caractères de la phthisie pulmonaire - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0087**

Source**Boite_035_A-5-chem | Anatomie pathologique.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

les trois derniers n'ont pas
encore été distingués.

Jusqu'à présent on connaît la phthisie
d'après les symptômes : Jaunes 20 cas, 14,
Portals 14, Bouveret, 3.

et l'autopsie d'après la dissection
d'un de la tumeur du poulmon (18-19)

1 Phthisie lobéculaire

lobes cœlés de substance homogène, opaque,
blanchâtre ou grisâtre ; les 1, couchés sur
poulmon formant 1 kyste avec 1 membrane ;
les autres adhèrent au parenchyme pulmo-
naire par continuité de substance.

3 états : d'abord très fermes ; puis
ramollis au centre (matière purulente), phthisie
lobéculaire de hauts par suppuration. D'au-
trophie (121-24)

2 Phthisie granuleuse : les poulmons
sont pris de granules miliaires
brunâtres, luisants, de consistance
cartilagineuse. A la coupe
ulcéreuse (126-27)

3 Phthisie avec mélanose : un affecté
que les autres : ulcération double

58
main tout noire, q du charbon et
brûlures q elle est que le rouage,
il devient dur, compact, noir, q du cuir
à demi-brûlé.

Les 3 autres espèces ont brûlures

- Les lésions intercutanées sont minimes
seulement de la matrice. Elle n'est
donc caractérisée à aucun moment (416)

- les inflammations et les catarrhes
peuvent provoquer le développement de la
létargie; elle n'est caractérisée
ni. (423-424)

C. L. B. y le Recherches sur
la phthisie pulmonaire Paris
1810.