

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-1-chem | \[L'électro-encéphalogramme\] et l'épilepsie. Item](#)[Statistiques sur l'EEG et l'épilepsie](#)

Statistiques sur l'EEG et l'épilepsie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0006

SourceBoite_044_A-1-chem | [L'électro-encéphalogramme] et l'épilepsie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Walter, Grey](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Statistiques sur l'EEG et l'épilepsie

6

sur 1 population de 4000 malades neurologiques, 2.200 se plaignaient de crises. Sur ces 2.200

- 875 (40%) → diagn. forme d'épilepsie idiopath.
- 370 (17%) lésions crâniennes
- 114 (5%) diagn. prob. de tumeur cérébr.
- 155 (7%) psychonévrose
- 690 (31%) : aucun diagnostic

sur le groupe EEG anormal H entier 52%. anéant 1

- 66% des epil. idiopath. → EEG anormal
- 50% lés. crâniennes _____
- 55% tumeur cer. _____
- 15% psychonév. _____
- 38% non diagn. _____

Sur ces derniers 38%, 47% des cas, le diagnostic reste incertain après l'EEG; 25% découverte de tumeurs; 15% épilepsie idiopathique; 10% anévrisme, hypertension, désordre congénital



G. Walter (EEG.)

4249-250)

