

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-10-chem | Paralyse générale. ItemCaractères anatomiques de la méningite chronique.](#)

Caractères anatomiques de la méningite chronique.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0155**

Source**Boite_035_A-10-chem | Paralyse générale.**

Langue**Français**

TypeFiche**Lecture**

Personnes citées**[Bayle, Antoine Laurent Jesse](#)**

Références bibliographiques**[Bayle, Antoine-Laurent-Jessé, Nouvelle doctrine des maladies mentales, 1825](#)**

Référentiel BNF**<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30070221b>**

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Bayle, Antoine-Laurent-Jessé (1799-01-13 -- 1799-01-13)

TITRE Nouvelle doctrine des maladies mentales

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1825

EDITEUR Paris : Gabon et Cie , 1825

caractères anatomiques de la méningite
chronique.

155

Lésions de l'arachnoïde et de la pie-mère, des deux plexus qui recouvrent la convexité et la base interne des hémisphères cérébraux.

1/ Direction de la plexure, qui devient rouge, avec des vaisseaux très dilatés

2/ Épaisseur de l'arachnoïde : elle peut devenir aussi épaisse que la paroi de l'artère
"à peine de quelques millimètres" (17)

3/ Opacité de l'arachnoïde : elle devient blanchâtre ou grisâtre, tantôt d'une manière uniforme, tantôt par plaques

4/ Densité de l'arachnoïde : alors qu'elle est normale, elle se déchire très facilement, elle devient alors une ténue qui elle est d'une ténue, et qui se détache du mouvement du cerveau, et que de la déchirer

5/ Épanchement de sérosité : on trouve de la sérosité :

a/ Dans la cavité de l'arachnoïde.

b/ Dans les ventricles cérébraux

BnF
MSS

4/ Dans le hémisphère de la pie mère

7/ Adhérence des méninges. Alors que
dans l'état normal, les ~~meninges~~ ^{meninges} sont plissées
sur le cerveau, dans le men. chron, en débarrassant
les membranes, on découvre 2 min. couche
de substance corticale.

8/ Granulation de l'arachnoïde: grains
minuscules.

9/ Épanchement sanguin sur l'arachnoïde
(voir p. 40)

Bayle. N^{eu} Docteur
du malade mental. 1825
n° 16. 25