

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-10-chem | Paralyse générale. ItemLes congestions cérébrales à l'origine de la paralyse générale.](#)

Les congestions cérébrales à l'origine de la paralyse générale.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0158

SourceBoite_035_A-10-chem | Paralyse générale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Lunier, Ludger](#)

Références bibliographiques[Lunier, Recherches sur la paralyse générale progressive, pour servir à l'histoire de cette maladie, par le Dr L. Lunier,](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30846843h>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Lunier, Ludger (1822-03-19 -- 1822-03-19)

TITRE Recherches sur la paralyse générale progressive, pour servir à l'histoire de cette maladie, par le Dr L. Lunier,...

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1849

EDITEUR Paris : V. Masson , 1849

Les congestions cérébrales, et l'origine de
la P.E. 158

— Les P.E. sont précédés de cong.
cérébrales + vives

Ex : Lenoir (56 ans) à 35 ans
"fut atteint d'un malade qui il dit puis
mal et qui s'appelle l'ischémie de
le fils. De puis ton, Lenoir a souvent
éprouvé des céphalalgies et des étourdissements
r 6."

— La congestion cérébrale se manifeste par
des symptômes qui sont très se le
rapport de l'insécurité, mais qui sont
liés en l'lesion possible de la motilité
de la motilité et de l'excitabilité, et des pe. visées.
Cerveau tranquille et utile, elle est assez souvent
surtout, lente, légère " (11).

— Souvent la P.E. mène à l'hémiplegie
provoquée par la congestion cérébrale.

a/ ou voit d'abord la hémiplegie
du membre supérieur.

b/ mais se diffuser, si forme



d'iniquités, d'anomalie (essais
moyens de contour 10^e), intensité)
à contour la forme de transition
vers le P-L.

q'q' le P-L, s'élève (hémiplegie
celle de respirer et de voir, ad'union
d'Annelle reprend sa marche
avec le P-L. (r 24)

- Le P-L. peut succéder à l'"hydro-
céphale chronique" (20)

- Si elle succède rapidement l'encéph.
lité, ~~qui~~ est l'"hydrocéphale aiguë", est
que la marche du malade est bris-
sée (30)

Lunier. Rech. sur le
P-L. moyr. 1849