

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-10-chem | Paralyse générale. Item](#)[Baillarger. Théorie de la paralysie générale.](#)

Baillarger. Théorie de la paralysie générale.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0170

SourceBoite_035_A-10-chem | Paralyse générale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Baillarger](#)

Références bibliographiques[Baillarger, Recherches sur les maladies mentales, 1890](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30047234r>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Baillarger, Jules (1809-03-26 -- 1809-03-26)

TITRE Recherches sur les maladies mentales

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1890

EDITEUR Paris : G. Masson , 1890

1 Le P-C. n'a pas 3 ordre de symptômes essentiels (dépense, diminution, prolytie); mais 2 (diminution et prolytie).

2 Au x de une nosologie, elle est étiologique, non et un Co place du l'olig, mais dans celle des diminution prolytiques. (461)

3 "La ~~Paralyse~~ manie prolytique, caractérisée par le dépense des souvenirs, par l'émulation de la parole, et le + souvent par l'insolite du pupille, est + vicieuse spéciale ayant son centre propre, et l'état indépendant du Co p-g." (461)

Les symptômes peuvent appartenir les périodes du Co P-C, mais en sont indépendants. La preuve

- par la lésion pariencephalitique chronique.
- évolution fréquente vers + diminution simple, sans prolytie
- formes intermittentes
- guérison possible.

BnF
MSS

4 "Qd la manie paralytique est unue
de p.g. elle nen doit pu moins être regardée
non cf 1 période de cette maladie, mais cf
1 variété distincte, d't- la p.g. n'est
alors qu 1 mode de terminaison." (484)

On voit la manie dipomane et la
dimanche en lui liv.

5 "La manie paralytique se caractérise
au début au double cours de la p.g. Elle doit
alors être considérée cf 1 complication de cette
maladie" (493)

Les accès de manie qui se manifestent
en P.C. n'ont que le revêtement. Ils
disparaissent

6 "Dans les cas nombreux où la manie
paralytique ne guérit pu et se termine direct-
ment P.C., elle nen doit pu moins être
considérée, non cf 1 période de cette maladie
mais cf 1 variété spéciale d't- la P.C. n'est
qu 1 mode de terminaison." (501)

in. Arch. sur les maladies mentales
1890. II. pp 449- 510.