

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston.](#) Item [Expériences de Spallanzani sur les plantes.](#)

Expériences de Spallanzani sur les plantes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0198**

Source**Boite_035_A-12-chem | Contre la sexualité des plantes. Tournefort, Pontedera, Dedu, Spallanzani, Möller, Alston.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Spallanzani, Lazzaro](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Exp^{te} de Spallanzani sur le plant

198

Le pt est de savoir que le th^{se} ne
choisit :

- les uns veulent que les em. engendrent
merveilleux à la fois d'homme et de oiseau
- les autres qui ils y peuvent avoir la
figure humaine du mâle
- d'autres enfin qui ils y ~~peuvent~~ engendrent
par la combinaison des 2 esp. parents,
et pour le mâle, l'autre pour la femelle.

1^{re} série d'exp^{tes}.

Examen anatomique des jeunes d'engend.
de ferret, de rat et de haricot, à différents
moments de maturation

- dès le 1^{er} moment, on voit la graine
formée et fournie

- puis il y a une autre que l'on
développe par la fécondation

- et la plante elle-même commence
à croître.

Le moment un va se diffuser de celui des
animaux au'on voit le pocher amble
formation.

Est-ce que le germe est introduit par la
pollen ? c'est ce Hübner de Needham
(à elle découvrir la hile avec le microscope)

2ème série d'exp.

- sur une espèce de Basilic (*Ocyropsis*
basiliensis) et sur l'hibou syriacus.
C'est des pl. à fleurs brunes droites.
En ôtant la corolle on voit (avant
l'ouverture de la fleur), on voit que le
dév. se fait normalement. La cavité a
forme d'une plante à pousse. Mais
une fois en terre, les graines ne poussent
pas.

De, et en plant, les embryons
dépendent de la manière de être fonction-
nalisés. Ils ne dépendent point de leur
environnement.