

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-13-chem | Linné. Item](#)[Croissance, reproduction et métamorphose des plantes.](#)

Croissance, reproduction et métamorphose des plantes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb035_A_f0251

SourceBoite_035_A-13-chem | Linné.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Linné, Carl von](#)

Références bibliographiques[Linné, Sponsalia plantarum, in Opera varia](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb372697648>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Linné, Carl von (1707-05-13 -- 1707-05-13)

TITRE Opera varia in quibus continentur fundamenta botanica, sponsalia plantarum, et systema naturae : in quo proponuntur naturae regna tria secundum classes, ordines, genera & species

LIEU DE PUBLICATION Leiden

DATE [19??]

EDITEUR Leiden : IDC , [19??]

- the outer bark becomes calyx
- the inner bark ——— corolla
- the wood ——— ligneous
- the medulla ——— pith

"La fructification montre la partie intérieure de la plante, nue et développée." (23)

- "La fructification met fin à la végétation à l'endroit où elle se produit, arrêtant le progrès de la moëlle, - qui autrefois se rendait à l'extrémité inférieure -, et provoquant la division de cette moëlle en 1 ou plusieurs germes ^(seeds) dont chacun est doté d'une vie vivante autonome." 

mais y la moëlle existant au-dessus du germe (sic), elle ne peut se multiplier ou produire de nouveaux individus sans l'aide d'une substance corticale. Cette aide, elle la reçoit de l'écorce, et du pith, qui sont dérivés de l'écorce.

Il arrive que la culture corticale
soit susceptible d'inverser le rudiment
medullaire de la fleur elle-même : de là
la fleur naine de Festuca, Aïra,
et Poa vivipara.

23. 24.

Liège - 1) inversion on
the root of plants.

(1760. Trid. repl. 1786)