

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais. Item](#)[Contre la théorie intestinale des fièvres. \(Chomel\).](#)

Contre la théorie intestinale des fièvres. (Chomel).

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0355**

Source**Boite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Chomel, Auguste-François](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Chronicité intestinale du piévre
(chomel).

"On a prouvé que l'inflammation du conduit digestif existait constamment chez les individus atteints de piévre grave." (6)

Or

- il est vrai que "chez le + sd ntre, les $\frac{3}{4}$ environ, on trouve du ulcère + ulcères dans la intestine vers la valvule iléo-cœcale" (6)

- chez certains on ne trouve rien :

Fouquier, Lermnier, Re'camier, Hucou (et Nouveau 7^e de médecine.) ont

fait des observations multiples (7)

- chez d'autres on trouve un ulcère de la muqueuse, ~~et~~ mais on le retrouve chez ceux qui ont d'autres choses. M. Gendie l'a observé sur ses chiens; Lermnier chez un maçon qui se tua en tombant d'un toit. (8)

- on trouve des cicatrices intestinales chez des malades morts avec des symptômes fébriles, adynamiques et toxiques,

BnF
MSS

très violent et. ch. de ~~de~~ Chouet : Revue
Journal de med. I) 191

- Aucun rapport entre la gravité des
lésions observées et la gravité des symptômes.
(9)

mais "la fréquence des ulcérations
intestinales dans le cours du malade
qui nous occupent" ~~est~~ "très élevée"
et "telle et non la cause de l'affection
fétale" (10). on peut le prouver :

- "Les ulcères qui annoncent la
formation des ulcères" (ulcères, excoriation)
sanguine, irritables, atrophiés etc) "ne
surviennent qu'à 1 semaine après l'entrée
la matière, vers le 10^e j. environ" (10)

- "Les ulcères occupent le plexus du con-
duit intestinal et la matière séjourne
davantage, chez elle ont acquis des
qualités irritantes" (10) : rien d'un
ulcère ou de l'adénome; mais 2^e la
fin de l'isthme, le cœcum et le colon
ascendant; rare dans le rectum et le
sigmoid.