

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A | Autour de l'Histoire de la folie \[A\]CollectionBoite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais. Item](#)[Découverte de la fièvre entéro-mésentérique par Petit.](#)

Découverte de la fièvre entéro-mésentérique par Petit.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0375**

Source**Boite_035_A-19-chem | Les fièvres après Broussais.**

Langue**Français**

TypeFiche**Lecture**

Personnes citées**[Petit, Marc-Antoine](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Découverte de la fibre entero-mésentérique

375 M Petit

En 1822 le conseil d'administration de l'hôpital de la Pitié, décide de réserver 2 salles de P.H. 4 à la clinique. Petit fut nommé médecin principal et un chirurgien (avec son maître Serres) (XIII-XIV)

2 méthodes d'enseignement offertes par Petit

1 La lecture analytique : s/ le modèle de Bourdier ; on se rapproche au cours de la lecture pour la situation puis le voir en examinant la méthode

2 L'autohypnose, il se compare le résultat avec la lecture analytique. (BnF MSS) (XV-XVI)

Ainsi, il prouve que certains hommes "à la marche tizane et irrégulière" présentent - à l'autopsie - des "altérations" multiples de l'intestin occupant tout le territoire du péritoine de la vésicule, et tout simultanément les glandes du mésentère correspondant à la portion lésée de l'intestin dans un état d'union de l'organisation" (XIX-XX)

On ne peut + constater cette affection
avec les signes atoniques et adynamiques
(xxx)

mais q^u les symptômes si variés
se rattachent-ils à la lésion ?

— "La première lésion de fonction appréciable
qui se manifeste est le trouble du
canal intestinal, et les symptômes s'en
suivent qu'on s'en suit". De
cette "la règle primitive de la maladie
est la source que de tous accidents." (xxii)

— Cette lésion est due à une cause
dilatative et le trouble tient de la compression
intestinale et dure même jusqu'à la
dilatation. (xxii)

— Cette affection est "transmise par
l'absorption des produits du métabolisme"
// de la "à l'universalité du système" (xxii)
xxii

— Le point de départ semble être le
"l'extrémité de l'intestin grêle et
le voisinage de la valvule iléo-caecale"

xxx