

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A](#) | [Autour de l'Histoire de la folie](#)
[\[A\]CollectionBoite_035_A-19-chem](#) | [Les fièvres après Broussais. Item](#)[Découverte de la fièvre entéro-mésentérique par Petit. \[suite\]](#)

Découverte de la fièvre entéro-mésentérique par Petit. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0376**

Source**Boite_035_A-19-chem** | Les fièvres après Broussais.

Langue**Français**

TypeFiche**Lecture**

Personnes citées[Petit, Marc-Antoine](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Sy mrtom

sa sa forme grave : 2 l. H^m, peu
 terreux, nombreux nœuds, dit injecté //
 volumineux et d'ici coulé; réponses
 pénibles; peu riche; soulèvement des
 lèvres; même continue jusqu'au bout le
 soir, puis rigide, bête; soit; vent
 douloureux, même 2 re. mention; aspects
 ulcères. urines pâles, urines peu abon-
 dantes (f 132-133)

A p'outorgie : taches vives sur
 l'inflixion, + rigides près du cœcum;
 elles sont boursoffées vers l'int., les
 glandes du mésentère couvrent sur
 même affecté échantillon (2 nois),
 rouge, blanchâtre, et injecté. En région
 échantillon engorgé; la méthode avait
 dure 19 temps, elle s'élevait ~~et~~ uterine
 (138-141)

C'est la pression inflixionale qui
 marque la limite entre l'intensité et
 le pouvoir élastique de la méthode morte
 ou ex. physiologie au début de la
 méthode
 (cf. f 150 19)

- La fièvre entéro-mérimélique est
une maladie bien individuelle
- son symptôme principal est le vomissement
des f. & dynamiques et à brèves
- son origine est souvent méritée
de la fièvre magueuse. (170)
- Il faut donc se méfier de la fièvre
magueuse en tout - (171)

Mais le signe de la maladie
ne réside pas dans la cure de la maladie
qui repose sur la brève et
la fièvre & dynamiques.

M. A. Petit. Traité de la
Fièvre entéro-mérimélique
Paris 1813.