

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_035_A](#) | [Autour de l'Histoire de la folie \[A\]](#)[CollectionBoite_035_A-19-chem](#) | [Les fièvres après Broussais. Item](#)[La fièvre a toujours un siège.](#)

La fièvre a toujours un siège.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b035_A_f0378**

Source**Boite_035_A-19-chem** | Les fièvres après Broussais.

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Caffin, Jacques-François](#)**

Références bibliographiques**[Caffin, Traité analytique des fièvres essentielles, Paris, Allut, 1811](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 30/11/2020 Dernière modification le 23/04/2021

" Il s'agit d'affection locale et primitive bien résistante, la quelle précède et espère du pyrexie, n'est qu'un symptôme isolé, combattue par elle m. H. le caractère de la maladie et on pense la vision de la phase locale et générale." (210)

Preuves

1/ Analogie entre certaines maladies sous fièvre et d'autres accompagnées de fièvre :

Ainsi : l'entérite saignante et la fièvre gastrique, m. symptômes : anxiété, sentiment de réplétion, douleur épigastrique, sécrétion de bile, nausée, vomissement, prostration (213)

De m. : céphalalgie venue et fièvre atoxique : vertige, évanouissement, somnolence jusqu'au coma, trépidation, tremor, prostration, état obtus de la sensibilité, me regard, affaiblissement du pouls (214)



878
2/ Les 14 premiers jours après la hémorrhagie
cervicale se caractérisent par une affection
des organes secrets : sur tte. et
augmentation de la secretion du plexus
(218)

3/ Les suites ont une 1^{ère} période
où plus f. bilieuses, du mucus
et f. muqueuses, du cerveau plus f.
atoniques 2231

on peut diviser c/ f. en 3 périodes

a/ la phase muqueuse : aff. des organes
qui sécrètent l'humour muqueux ou
pituiteux : langue blanche, salive visqueuse,
aphasie, toux, éternuements et perspiration
et érysipèle, coliques, éjections muqueuses
vers, respiration faible, toux et
expectoration muqueuse (229-230)

b/ la phase bilieuse : son tour
aboutit à l'érysipèle, éruptions et
vomissements de bile, langue jaune. Il y a