

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_044\\_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite\\_044\\_A-2-chem | Arriération mentale. ItemLes déficits primaires : analyse clinique \(suite et fin\)](#)

## Les déficits primaires : analyse clinique (suite et fin)

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0034

SourceBoite\_044\_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Tredgold, Alfred](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

- 1<sup>re</sup> maladie apparue très tôt à la naissance.  
Le plus tôt à + près du temps H - pit. avant.

(A) forme infantile (sur H fréquente chez les juifs)

elle apparaît à la fin du 3<sup>e</sup> mois :

34

- fièvre des muscles de dos, et de cou; altération  
de la macula (boche grise); boche rouge de la  
foret.

- 1 peu + tard. faiblesse accentuée des muscles: l'enfant  
ne peut se relever; qd il s'agit d'obés, il se laisse  
tomber. Vision réduite à la seule lumière

- atrophie des muscles, emaciation; exagération  
des réflexes rotulés, convulsions spasmodiques.

à ce point mort à l'âge 15 mois et 2 ans.

(B) Il y a 2 formes infantiles caractéristiques  
à la précédente, 1 forme précoce et 1 forme tardive.



Tredgold (Mental  
Deficiency  
n° 199. 245.

