

Les arriérations secondaires : Analyse clinique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0036

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Tredgold, Alfred](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Arrivations secondaires : Analyse étiologique

36

1 Traumatisme : la maladie de Little

(1862) - en g^l hémorragie au cours de la naissance.

- x de une motricité paralysée, pouvant aller de la monoplégie légère, à la quadriplégie

② d^l de deux cas, ataxie (mvt irréguliers, incoordonnés) qui s'ajoutent à l'émotion et les troubles fonctionnels

③ épilepsie idiopathique.

- on x de une mentalité : degrés très variables.

5/ Tredgold, certains cas d'instabilité sensorielle à la naissance.

2 Paralysie congénitale : on a souvent confondu avec la maladie de Little, des formes paralysées qui surviennent au cours de la naissance, mais qui sont liées à l'origine intra utérine.

en g^l, destruction de cellules nerveuses, démyélinisation, défauts de myélinisation, défauts de myélinisation, défauts de myélinisation.

3 Incompatibilité de facteur rhésus : → hémorragie ; et est le cas où la mort survient, rigidité extrême, et aménorrhée.

B Causes infectieuses.

1/ méningite: maladie du coussin de l'encéphale: fièvre, vomissements, + signes d'atteinte corticale (stupéfaction du coma; au lieu de l'écrit; d'écrit de son visage; paralysie, rigidité du cou, convulsions)

Des variants avec la paralysie et les convulsions au début.

- x de une mental: perte et parti des acquisitions antérieures qui ne sont pas récupérées (parfois le langage simplifié, il ne reste que 2 ou 3 mots); incapacité d'apprendre. Instabilité de l'attention - Instabilité émotionnelle.

2/ Encephalite lethargique: étudiée à propos de l'épidémie anglaise de 1918. On a retrouvé des épidémies antérieures (Copenhague 1615; Tübingen 1712). En Angleterre, il y eut 5.039 cas.

Ses formes sont très variées: elles peuvent être très atténuées (diagnostic d'influenza)

- signes physiques: Parakinsonisme (lentueur du mouvement, rigidité, tremblement, exaltation de la tête, insensibilité du visage, salivation excessive); sans tous les signes du Parakinsonisme, il peut y avoir + triboire parfois obésité - Inversion du rythme du sommeil (sommeil diurne, agitation nocturne) - Irregularité du rythme respiratoire - Paralyse oculaire et crise oculogyre.