

Les arriérations secondaires : Analyse clinique (suite)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0037

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

- signe γ : ② perte du contrôle émotionnel:
(c'est un g^e auquel appartiennent G+) = irritabilité; 37
impulsivité, crise de colère - Ds ces cas peu graves,
perte totale des sentiments d'affection, hargne,
violence, actes criminels (intentionnels) : à ce point de
l'an est arrivé en l'homme l'envie de couper le lien
de l'homme avec sa paix de cerveau.

③ Déficit intellectuel : perception impériale;
déficit de la mémoire, inattention, incapacité
à l'effort; perte de l'ambition. - Pas de progrès
éducatifs. - Ds certains cas, le trouble ne portera
sur le système le + souvent

3 Hydrocephalie = exces de liquide
cérébro-spinal - L'hydrocéphalie peut être
- externe (dans l'espace sousarachnoïde) = atrophie
du nerf dorsal du tissu cérébral
- interne (dans le ventricule) : hypertrophie des
hémisphères. - au lieu d'instruction de la circu-
lation du L.C.R. / à cause d'un malformations
ou tuméfaction

① Ds certaines le 1^{er} plan du tableau clinique
est occupé par des convulsions, la paralysie, la
excitation; la mort est rapide

② Ds d'autres cas, + lent et + lent;
- déficience musculaire, marche mal coordonnée,

paralysie et strabisme.
caractère doux, affectionné, obéissant
débilité mentale, portant intempérie, peu verbal
mais bonne apprendre (numérique, mots)

4. Atteinte syphilitique: l'infection se
produit après la naissance

taux d'atteinte: s/ Haff (1926)
elle sont 1,26%; s/ Paddle (1934) 6,3% de
la population des séptiques. s/ Thogold, environ
3% -

(A) garçons présentent des signes de la naissance:
forte ~~débilité~~, + épilepsie, paralysie, cécité, intégrité
pupillaire - grave lésion corticale.

(B) D'autre ne présentent que des
débilités mentales (retard de la maturation; appren-
tissage retardé jusqu'à l'adolescence).

souvent premiers qui n'ont pas présenté de
signes physiques à la naissance, manifestant
avant ou après la puberté; lorsque ces lésions deviennent
évidentes = phases de dépression et d'excitation

hallucinations, puis reconnaissable généralement
signes physiques (épilepsie, microcéphalie,
convulsions, signe pupillaire d'Argyll-Robert-
son; débilité croissante; gênes,)