

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale. ItemLes arriérations secondaires : Analyse clinique \(suite et fin\)](#)

Les arriérations secondaires : Analyse clinique (suite et fin)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0039

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

et d'atténuation des signes γ . mais le 39
retrait n'est jamais total et s'il le n'est
n'est pas appliqué au delà de la 1^{re} année

2 Déficit hypophysaire, dystrophie adiposo-
génitale ou syndrome de Fröhlich. Il en y a
un type définitement.

BnF
MSS

