

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale. ItemLa pathologie du cerveau dans l'idiotie et l'imbécilité \(suite\)](#)

La pathologie du cerveau dans l'idiotie et l'imbécilité (suite)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0043

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

des anomalies structurales, des régions du
néo pallium le + récemment acquises." 43

- En ce qui concerne la myélinisation cellulaire,
elles sont moins riches chez les déficients.

On a pensé que le corps calleux, cette voie couronnée
inter-hémisphérique est + petit chez les déficients.

Ashby et Stewart ont montré que c'est
inexact. (1934)

- Les cellules interstitielles du cerveau ou
neuroglie, ont de 2 types

① les unes "microglies" (d'origine mésoder-
mique) ont + rôle de phagocytose des neurones
dégénérés : elles augmentent lors de dégénérescence,
mais pas l'élimination

② les autres, astrocytes et oligodendrocytes
(d'origine ectodermique) (obs. de Meyer et
Cook, sur 22 cas d'amaurose diverses 1937)
cette augmentation peut être diffuse ou focale
les uns attribuent cette glie à l'anomalie prim.
du dev. de la glie elle-même; d'autres en font + conséquence
de lésions inflammatoires; d'autres en font +
substitut au dev. insuffisant des neurones.

5 Phénomènes chimiques.

Ashby et Glynn (1935) analysant le matériel

BnF
MSS

grâce des lobes frontaux de 62 déprimés et de
9 normaux adultes, trouvent chez les déprimés
- 1 $\rightarrow$ de l'eau et du phosphate - protéines
- cette $\rightarrow$ est direct^{iv} proportionnelle à l'age
mentale du malade.

Tredgold (mental Depravity
n° 211. 121)

and anti-convulsive treatment

for the brain

"Igora trouva l'anté"