

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale. ItemLa débilité mentale et les tests](#)

La débilité mentale et les tests

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0046

SourceBoite_044_A-2-chem | Arriération mentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Définition de la déb. mentale.

1/ par le QI

	Stanford	T. Merrill	Wechsler
-36	70	73	67
-26	80	82	78

(un handicap ≥ 50 ; et idiotie ≥ 30)

2 par l'inadaptabilité sociale

3 Doll a défini 6 critères de déviance:

- 1. incompétence sociale
- 2. subnormalité mentale
- 3. arrêt de développement
- 4. ~~est~~ résiste à la maturité
- 5. est existentiel*
- 6. est incurable.

Et mesurer l'incompétence sociale, "Social Maturity Scale" de Weinland



Forme de distribution des cas révélos.

- Pearson et Jaederholm ont ~~testé~~ testé les enfants d'Irlande: or la queue de courbe présente l'effet ressant ($1/1000^2$)




- Bath et Mac Nemmen ont refait l'exercice

en Ecône, en tentant de les en faire les 1 année.
 revient au de là de 30 (cf. Rapport de Fager
 Robert. Cgri de Y. 12/11/50. 1950) : En où on
 devrait trouver le chiffre moyen de 0,7 au trouve
 12,5.

- ① D'où : 2 sortes de défilite
- bête normale (symétrique de s. int.)
 - défilite exogène due à des traumatismes etc...

② La queue de courbe est bimodale : on
 deviens de 45 de qI, surtt de filites
 par causes pathogènes



Divisions de la défilite

1 Tredgold : $\left\{ \begin{array}{l} \text{défilite primaire (garden variety)} \\ \text{défilite à causes connues} \\ \text{défilite à causes mixtes} \\ \text{défilite à causes inconnues} \end{array} \right.$

2 Lewis : $\left\{ \begin{array}{l} \text{défilites subéthérées (= garden v.)} \\ \text{défilites pathologiques} \end{array} \right.$

3 Strauss : $\left\{ \begin{array}{l} \text{défilites endogènes (= garden v.)} \\ \text{défilites exogènes (lésions cérébrales} \\ \text{qui ne sont pas très importantes)} \end{array} \right.$

4 Werner : les défilites endogènes sont le redoublement
 et faut les stériliser.