

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-4-chem | Lagache. \[Psychologie\] sociale.](#)
[ItemRapports de la mère et de l'enfant](#)

Rapports de la mère et de l'enfant

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0073

SourceBoite_044_A-4-chem | Lagache. [Psychologie] sociale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Ribble, Margaret](#)
- [Wallon, Henri](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Envisagé du côté de la mère et du groupe, les rapports ont l'impression de la ψ de la mère, et aussi de la culture du groupe. Des notes soc les uns maternels sont caractérisées par la frustration et réglementation. des conduites d'assimilation ou l'importation sur les conduites d'adaptation.

On croit que l'enfant est un être ψ social, et que quel que soit le facteur maturation agit de l'influence: théorie matriste. Freud a montré que l'infl. du milieu était capitale. c/. Wulfer: Origine et développement du caractère chez l'enfant: il y a d'abord une phase de la nutrition, qui fait suite à l'union organique, et qui précède la formation grégaire.

Études de Margaret Ribble. Anna Freud: Children without families. Schreier: Perle de la mère et l'enfant (in Bull. de la soc. de ψ . T. 18. et Enfant).

Pes 1^{er} mois.

Atelognathisme - Hétérognathisme. Mère et l'enfant est à première. Une d'achète intentionnelle, ou adaptée (comme la succion): déficiences du système nerveux (comme l'absence corticale; non myelinisation du système nerveux). Le nourrisson est occupé par les tensions internes (intéroceptives et proprioceptives) et l'absence de socialité (cf la vie mortelle de Blondel). La culture humaine n'est pas encore établie (myelinisation).

BnF
MSS

capillaire (mû / agit). Des réflexes nauséux mû hû hû et hû hû
Tous de morphologie hû élève.

Le comportement de l'enfant se caractérise par l'achitè musculaire

- achitè de nausé

- achitè du thumique (debut de la crue - paroxysme avec
cri, suction, ou élévation hû - puis repos avec encore l'élévation
musculaire).

Cette achitè répond à l'élévation interne : pain, ou asphyxie
(due à la proboscée carischan du ventre, et hû gres besoin
d'oxygène). L'achitè de l'enfant n'est pas la même elle n'est
cette achitè s'accompagne de la hû hû hû

Des circulations extérieures peuvent favoriser la détente (suction,
vercement, élévation de la lumière). Si les soins de la mère sont
insuffisants, on voit des troubles respiratoires, et sur l'achitè,
l'ouïe mû hû de l'achitè, subit au delà de la période
physiologique.

Les caractères de la physiologie du nourrisson, sont le
désordre (respiration superficielle ; troubles de la digestion).
La maturation parachronelle (myelinisation), peut être (normale)
par les rapports sociaux. Si l'hospitalité réalise des conditions
sociologiques particulières : ~~un~~ l'enfant reçoit trop peu de
stimulations perceptives sociales ; il voit peu la mère - D'où
interne, troubles respiratoires, et digestifs, qui se prolongent
jusqu'à 2 ans.

L'organisme est insuffisant pour maintenir l'équilibre
du métabolisme. D'où danger de la perte de la mère.
Il peut se produire l'espérance de vivre mû hû.