

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_044\\_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite\\_044\\_A-4-chem | Lagache. \[Psychologie\] sociale.](#)  
[ItemRapports de la mère et de l'enfant \(suite\)](#)

## Rapports de la mère et de l'enfant (suite)

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0074

SourceBoite\_044\_A-4-chem | Lagache. [Psychologie] sociale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Ribble, Margaret](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

De la vie sociale, l'enfant a déjà des exp<sup>s</sup>:

74

- exp<sup>s</sup> tactile: (surtout buccale), qui permet / diminue la tension.
- exp<sup>s</sup> maternelle qui règle la nutrition, et la respiration: l'enfant a besoin d'être caressé, tenu, bercé. Importance de la posture (l'enfant a peur de tomber: d'où sur saut) l'enfant est passé d'un liquide à l'alimentation solide.
- exp<sup>s</sup> auditive: dès le 1<sup>er</sup> trimestre de vie extra utérin, comme humaine à l'action calante.

En cas de restriction inadéquate

① negativisme: anorexie et hyperhémie et hypotonie musculaire consécutive (cris difficiles à calmer) des muscles lisses et striés

② apathie dépressive; le thyréoisme (le nourrisson ne sue, ne est obligé de le nourrir à la cuillère); troubles cardiaques; troubles digestifs (gaz, diarrhées), troubles respiratoires. Th<sup>se</sup>: vomissements; élévation du fond du lit; massage du corps.

D'origine souvent i/octionner e/ de la né/otale. D'après Pille le trouble ne consiste de en circulation déficiente du cerveau. Sous le monde actuel, le nourrisson peut vivre des réserves de graisse.

Rôle important de la succion. La vocalisation s'appuie sur les fonctions orales primitives. La succion libre donne de bons résultats; la succion provoquée entraîne une dépression ou un état stuporeux.

l'âge du sevrage est fixé et chaque civilisation,  
en fait il demeuré le modèle sur le comportement de l'enfant ;  
il peut se faire de la 4<sup>ème</sup> mois, (en fait état + résist.)  
ou la prostration, s'il n'a été satisfait.

- m de frustration de la mère.
- nécessité de la succion libérée.
- nécessité et sevrage progressif.

la regression est la recherche adaptative