

Définition de l'hystérie (James)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0544

SourceBoite_034_B-27-chem | Hystérie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[James, Robert](#)

Références bibliographiquesJames, Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, d'anatomie, de pharmacie, d'histoire naturelle, etc... Traduit de l'anglois de M. James par Mrs Diderot, Eidous et Toussaint, revu, corrigé et augmenté par M. Julien Busson, Paris, Briasson, 1746-1748

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Définition de l'hystérie

544

(James)

"Je l'ai défini une affection spasmodico-convulsive nerveuse, causée par une stagnation ou corruption de lymphes ou de sang dans les vaisseaux de l'utérus par quelle au moyen des nerfs du t^os sacrum, du renif et de la moëlle épinière influent sur les parties nerveuses du corps."

art. Hystérie p 442



Classification des plantes

(1890)

"Je te propose une affinité entre
 les végétaux, d'après leur
 organisation et leur développement
 au point de vue de leur
 structure et de leur
 fonction. Les végétaux
 sont classés en trois
 groupes principaux :
 les algues, les
 champignons et les
 végétaux supérieurs.
 Les algues sont
 divisées en trois
 classes : les algues
 vertes, les algues
 brunes et les algues
 rouges. Les
 champignons sont
 divisés en deux
 classes : les
 champignons
 supérieurs et les
 champignons
 inférieurs. Les
 végétaux supérieurs
 sont divisés en
 deux classes : les
 végétaux à fleurs
 et les végétaux
 à feuilles persistantes.
 Les végétaux à
 fleurs sont divisés
 en deux classes :
 les dicotylédons
 et les monocotylédons.
 Les végétaux à
 feuilles persistantes
 sont divisés en
 deux classes : les
 gymnospermes et
 les angiospermes.
 Les gymnospermes
 sont divisés en
 deux classes : les
 conifères et les
 gymnospermes
 non conifères. Les
 angiospermes sont
 divisés en deux
 classes : les
 dicotylédons et
 les monocotylédons.
 Les dicotylédons
 sont divisés en
 deux classes : les
 dicotylédons
 supérieurs et les
 dicotylédons
 inférieurs. Les
 monocotylédons
 sont divisés en
 deux classes : les
 monocotylédons
 supérieurs et les
 monocotylédons
 inférieurs."

