

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_034_B | Histoire de la folie, préparatifs \[B\]CollectionBoite_034_B-32-chem | Mélancolie. Item](#)[Lorry \(1726-1783\) De melancholia et morbis melancholicis, Paris 1765. 2 vol.](#)

Lorry (1726-1783) De melancholia et morbis melancholicis, Paris 1765. 2 vol.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb034_B_f0615

SourceBoite_034_B-32-chem | Mélancolie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Boerhaave, Herman](#)
- [Lorry, Anne-Charles](#)

Références bibliographiques[Semelaigne, Les pionniers de la psychiatrie française, avant et après Pinel, Paris, Librairie J.-B. Baillière et fils, 1930-1932](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 12/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Lorry (1726. 1783)

615

De melancholia et morbi melancholici

Paris 1765. 2 vol.

(seu facili quae pioniens)

Ainsi que Boerhaave définissait la mélancolie
et le délire par l'idée avec prédominance l'une ou l'autre,

Lorry, la met à l'origine physique. L'âme
est vivement troublée par des objets qui ont été
l'objet de l'imagination, et ne peut résister aux idées qui en
dériveront.

2 sortes de mélancolie

- celle de l'origine est due les troubles : la nerveuse
la sensation peut vibrer les fibres animales, mais augmente
aussi la lésion des autres fibres qui ne peuvent aussi
résister à vibrer. mais si cette lésion augmente, alors
il peut y avoir une immobilité qui arrête le cours du
sang et des esprits animaux.

Ainsi, si le cerveau peut se former les h. en substance
est ainsi que la forme le spasme
- ~~le spasme~~ ^{le spasme} est une contraction du pyle avec
constriction ^{est} 15 minutes disparaissant à la suite d'une
salutaire. Et si le spasme persiste, il se résout
si le spasme diminue, il se résout.

2 il peut être variable : il peut de un moment
que le spasme qui lui a été provoqué par

BnF
MSS

1 sensation n'est accompagnée de peur.

chez le h. la mélancolie nerveuse agit sur l'hypothalamie ; chez la femme l'hygiène (longue le phéno-
spermocytique s'unissent et se reproduisent à bref
intervalles)

- elle se l'origine de l'humeur : une humeur.
Le humeur, imprégné d'acide agit sur le nerf.
Le sang épais stagne dans les membranes et le nerf
qui naissent aux organes du sens sont comprimés.