

[Lois de la transmission nerveuse (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0233

SourceBoite_044_A-10-chem | Neuro-Physiologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).


Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

6 Prolongation on stimule le n. sensible ²⁶
et on recueille 1 décharge consécutive (after-
discharge). Elle est sur le sensible et dure/p.
certain (car on a des neurones intermédiaires).
cette after. décharge peut durer + ou - sec
voire minutes.

7 Fatigabilité. Le nerf ne se fatigue que
difficilement. Mais qd il y a passage de l'excitabilité
à la fatigue.

8 Toutes ces propriétés ne sont qu'attributs : on a
créé des conditions qui engendrent l'aspect des
réponses. De l'excitabilité on parle et cond. hum.
nales. La cond. hum. est
- immédiate - ou différée.


cond. hum. par subordination hum : elle est un très
souvent par l'exc. sup. (excitation ou inhibition)
à que l'excitabilité n'est même en cause
et l'exc. de vue macroscopique.



BnF
MSS on peut modifier le résultat
d'excitation, si qqes res. avant
on a 1 excitation il a 1 exc. diff. : resp.
conditionnée. Il se peut que S.N. est présent et le
résultat est

Analogie formelle entre certains phéno
physio et phéno ψ (sommativité, distribution, inté-
gration). Vitesses différentes se font en 50 manières

A quel niveau se situe la concurrence peut-être
au 4^{ème} relais.



Ces considérations de temps indiquent qu'il y a un
retard se situe vers le 4^{ème} relais. Au phéno de
perception on est très proche du versant moteur
(déjà réaction motrice). La perception est à
sensu et déjà l'élaboration, l'élaboration d'une
réaction.

Les robots actuellement construits sont trop com-
pliqués par qu'on n'arrive pas à maîtriser le comportement
actuellement en Angleterre, et l'Europe se ne peut com-
prendre parfaitement le comportement (comme le nouveau robot
à 5 électrons, qui elle prend à 7 antennes). Le
nombre de combinaisons possibles est de 5.12 et
peut être de 10¹⁰⁰

Certains neurones auraient peut-être des
propriétés chimiques qui en font des leaders.