

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_035\\_B | Autour de l'Histoire de la folie \[B\]CollectionBoite\\_035\\_B-11-chem | Statistiques. ItemLa méthode statistique en médecine \(Louis\)](#)

## La méthode statistique en médecine (Louis)

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb035\_B\_f0330

SourceBoite\_035\_B-11-chem | Statistiques.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Louis, Pierre Charles Alexandre](#)

Références bibliographiques[Louis , Recherches sur les effets de la saignée dans quelques maladies inflammatoires, et sur l'action de l'émétique et des vésicatoires dans la pneumonie, Paris, J.-B. Baillière, 1835](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

(Louis)

" que, par ex., dans l'épidémie que  
500 malades, puis un dixième<sup>m</sup> par conséquent  
qui n'ont été atteints de la maladie régnante  
viennent souvent à l'espèce de mort<sup>m</sup>; que 500  
autres pris de la même manière, aient subi  
mort<sup>m</sup> diff<sup>m</sup>: ne devons-t-on conclure, s'il  
est mort 1 + 50 autres de maladies diverses  
en ces que pour les 2<sup>es</sup>, que le traitement des  
1<sup>ers</sup> est supérieur à celui des 2<sup>es</sup> ? "

- A l'objection que les groupes ne sont  
jamais homogènes, il faut répondre

" que cet objection est due à l'impossibilité  
d'apprécier chaque cas avec l'exactitude  
en que sorte math que il faut nécessairement  
compter, puisque les erreurs, des erreurs  
inévitables, et tant en n<sup>o</sup> 1<sup>er</sup> 2 groupes de  
malades traités par des procédés différents,  
ces erreurs se compensent et peuvent être  
négligées, sans altérer sensiblement l'exactitude  
des résultats. "



- "On parle sans cesse de l'usage du siècle  
en médecine; mais est-ce que cette méthode  
est la méthode, si ceux qui écrivent,

en face de la : j'ai souvent,  
n'ayant ni : j'ai un but et but de  
lui ... si on a 2 moyens de  
recueillir l'effet des séries en trois  
séries, c'est qu'en un point et  
une empirique.

Louis. Recherches sur les  
effets de la saignée.

171. 19.