

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_044\\_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite\\_044\\_A-14-chem | \[Electro-encéphalogramme\] Item](#)[\[L'EEG, le sommeil et le tonus cortical \(suite\)\]](#)

## [L'EEG, le sommeil et le tonus cortical (suite)]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Cote**b044\_A\_f0300**

Source**Boite\_044\_A-14-chem | [Electro-encéphalogramme]**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Pavlov, Ivan Petrovič](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

### Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Recherches sur le cortex.

300

Bien que le phéno  $E\bar{C}G$  du sommeil com.  
commence en g = le cortex, parfois le phéno  
se prolonge + accentue sur toute ou telle partie du  
cortex. Parlova avait défini le ~~seul~~ sommeil  
d'1 onde d'inhibition qui gagne le cortex à  
partir d'un déterminé.

Whitridge ( $E\bar{C}G$ .  
pp 125-126)

BnF  
MSS

