

Les stigmates de l'hystérie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0010

SourceBoite_014-1-chem | Charcot.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les stigmates de l'hystérie

431

En dehors des accès, on peut reconnaître l'hystérie (pour des symptômes de paralysie, anesthésie, éblouissement etc) et certains autres de "phases permanentes", ou "stigmates"

- rétrocession du champ visuel
- hémianesthésie unilatérale double
- troubles sensoriels divers
- anesthésie pharyngée
- co-motilité de muscles masticateurs et parotidiens par application de l'électrode.

"voulant être sûr de n'être pas saisi, ils recherchent constamment leur même condition sensorielle et affirment sa normalité."

Il arrive cependant que 1 symptôme soit noté à l'ht note.

BnF
MSS

