

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie, HystérieCollectionBoite_014-1-chem | Charcot. ItemAnalyse d'un mutisme hystérique](#)

Analyse d'un mutisme hystérique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0038

SourceBoite_014-1-chem | Charcot.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

24. Août 88.

Analyse d'un mutisme hystérique.

357-361

J. h. de 21 ans

Charcol rappelle ce 17^e leçon du III du M. du Sex. M.)

- Pas de trace de graphie : il rend correct^{ment} et rapidement ^{ment} ses questions qu'on lui pose
- Aphonie : incapable de prononcer 1 mot, un cri. Bien l'explique, et l'explique quelques fois "Tou".
- Incapacité d'écrire mots.
- Pas de surdité verbale : on lui demande de montrer 1 œil, 1 plume, 1 rose et sur la table : 7 6 / 41
- Pas de cécité verbale : on lui montre 1 carton "communication gratuite" ; il veut en réponse "cel de médecins qui se soignent"
- La perte de mimique expressive (vider la tête en 10 ans, le reconstruire en 10 ans) ; - l'absence (aphasie) "la perte de la manipulation de gestes complexes, inintelligibles"

362 Ce cas se représente "le type du mutisme hystérique d'He 12 partie"

- L'aphasie organique ~~est~~ (ou celle du type Broca, aphasie motrice) est bien accompagnée de troubles complets (asymétrie, surdité ou cécité verbale)
- "L'aphasie hystérique est 1 affectus hysterique"



c'est d'abord la répartition de certains récepteurs
à l'échelle physiologique du langage.

"si on se rappelle la distribution de branches de carbure
y compris, il est très facile de comprendre que l'équilibre
de la branche ~~de~~ de la visière aux récepteurs
réflectifs, de la visière du côté gauche, de la commande à
l'avant du bras du bras, de la commande de la
bouche du langage, sans distinction; ce n'est que
c'est-à-dire, on n'a pas de récepteurs pour le
collapsus que l'on ne fait pas de récepteurs du langage
normale et récepteur r.t. et reprendre un langage
normal.

Dans l'hygiène, la sélection est normale, les
ne de culture qui ne de ne physiologie, en cas de
si par exemple à l'échelle: aucun de distinction
pour l'hygiène que on y observe d'ailleurs que les
conduites."

chez le hygiène soustraitive, on peut
reproduire ce qui est un abus.