

Le siège cortical de l'hystérie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0061

SourceBoite_014-1-chem | Charcot.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

320

- A propos d'une malade présentant une paralysie
avec lésion
brachiale, l'amygdales ne réagissent pas, lésion
unilatérale au ~~cortex~~ cortex au foyer

"De quoi s'agit-il donc selon ? A n'en
pas douter, il s'agit de lésions motrices et motrices et
ces; mais on s'interroge - elle, quelle est la nature?
est, je pense, et c'est en fait de l'hémiparésie cérébrale
du côté opposé à la paralysie, et à mesure de la
zone motrice du lobe qui il faut le noter."

Il faut admettre aussi "qu'elle a une étendue
limitée à la zone motrice, et qu'elle s'adapte
à une situation médiane aux parties
adjacentes du lobe préfrontal."

321

- mais il ne s'agit pas "d'une lésion au foyer
organique... Ici, il ne s'agit pas de questions que
de l'existence d'une lésion que l'on peut démontrer par
un examen d'investigation anatomique, et que
par ailleurs, on est convenu de désigner sous
le nom de lésion dynamique ou encore

BnF
MSS

fonctionnelles :

326 "Notre maladie s'élève considérablement /
hygiénique ?"

438 "celle de l'écorce saine du hémisphère
cérébral - je crois avoir constaté dans
mon examen - qu'il faut chercher la
cause dynamique d'un trouble symptomatique
laine" (de l'hygiène).