

[J-P. Philips (Durand De Gros), Cours de Braidisme - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0114

SourceBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie, Hystérie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

CINQUIÈME CONFÉRENCE.

91

Ces manipulations ont pour but, soit d'enrayer l'innervation périphérique par la compression de certains trajets nerveux, et d'accroître ainsi l'hyperénévrerie cérébrale; soit d'impressionner l'imagination du sujet par la voie de la sensibilité tactile, en lui faisant, pour ainsi dire, *savoir qu'il est entre vos mains*; soit enfin de provoquer de vous à lui ce conflit direct des deux innervations, que les mesméristes supposent pouvoir s'établir à l'aide de pareils contacts.

Au moment de suspendre ces manœuvres, dont l'action est indubitable, quelle qu'en soit d'ailleurs la vraie théorie, annoncez à votre sujet qu'il va bientôt se trouver dans l'impossibilité d'ouvrir les yeux. Frictionnez-lui doucement les paupières encore une fois, puis replacez votre main sur sa tête, le pouce près de la racine du nez, et, cela fait, prononcez les paroles suivantes d'un ton assuré et avec une nette accentuation : *Vous ne pouvez plus ouvrir les yeux !*

Si, en dépit de votre affirmation, les yeux s'ouvrent, renouvez jusqu'à deux fois la même tentative; si vous échouez, abandonnez ce sujet pour passer à un autre. Les personnes *influencées* feront des efforts plus ou moins énergiques pour ouvrir les yeux, sans pouvoir y réussir. Ces efforts se traduisent par les contractions du muscle occipito-frontal et la tension de la paupière supérieure, dont le muscle élévateur reste paralysé.

Après avoir constaté l'état de vos sujets à l'aide de cette exploration, vous faites sortir des rangs ceux qui n'ont pas offert les signes de l'état hypotaxique; vous passez ensuite, et sans perdre de temps, aux appli-

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957



