

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie.](#)
[HystérieCollectionBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski. Item](#)[Stigmates et paroxysme dans l'hystérie](#)

Stigmates et paroxysme dans l'hystérie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0352

SourceBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

2 - "L'hystérie" comme M. J. de la Tourette, les signaux,
sur lesquels reposent les proxymies."

- A côté du proxyme aigu, on a l'hystérie,
l'hystérie et le proxyme prolongé ou état de mal.
Au degré le plus élevé, on a l'hystérie proximique
permanente état second."

3 on a plusieurs classes de proxymes
hystériques. Il y a les trois variétés de l'y
mètre : classification et description pour les
exemples."

En bref, les proxymes ont 1 mit
g : "la possibilité, au plus la durée et la durée,
d'être immédiatement à l'état normal."



1888
1889

1890
1891

1892
1893

1894
1895

1896
1897